

วิธีเบ眷หางการรักษาอาการไข้


สวนใหญ่จะเป็นการรักษาตามอาการ ได้แก่

- ให้ผู้ป่วยพักผ่อน
- ให้ยาลดไข้ และเพิ่ดตัวเพื่อให้ไข้ลดลง เพราะเด็กบางคนอาจซักได้
- ถ้ารับประทานอาหารไม่ได้เลย แพทย์อาจให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดไม่ควรให้ยาปฏิชีวนะ เพราะไม่มีประโยชน์และอาจทำให้ເຫຼືອໄວດตามร่างกาย ต้องมาเมื่อเกิดโรคแทรกซ้อนมักจะมีอาการรุนแรง
- ถ้าไข้สูงส่งๆ 72 ชั่วโมง ให้ยังไม่ลดลงต้องนึกถึง โรคแทรกซ้อน



วิธีรักษาไข้กันไข้แม่

โรคหัดป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเด็กอายุตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป ถ้ามีภาระมากของโรคอาจให้ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 6-9 เดือนได้



ความรู้เกี่ยวกับ

โรคหัด

เผยแพร่โดย
กองสาธารณสุข
องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. ๐๘๕-๕๗๑๒๓๔

โรคหัด

โรคหัดเป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยที่สุดโรคหนึ่ง ซึ่งเกิดตั้งแต่อดีต แต่ส่วนใหญ่พบมากในช่วงฤดูหนาว กลุ่มอายุที่พบได้บ่อยที่สุด คือ 1-4 ปี (ประมาณร้อยละ 80), เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี พบร้อยมากเพียงร้อยละ 7 เพราะโดยทั่วไปภูมิคุ้มกันจากมาตรการผ่านรกไม่แข็งบุตร จะอยู่ประมาณ 8-10 เดือน ตั้งนั้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน จึงมักจะไม่ออกรหัด ยกเว้นบางรายที่ภูมิคุ้มกันในมาตรการมีน้อยมาก



ติดต่อ กันได้ทางไหน

โรคหัดติดต่อ กันได้ทางการหายใจซึ่งเทื้อหัดจะแพร่กระจาย การหายใจ ตาม และน้ำมูกของผู้ป่วย

อาการของโรค

หลังจากที่ได้รับเชื้อแล้วประมาณ 8-12 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีไข้ โอมาก มีน้ำมูก ตาแดง เป็นอาหาร ถ้าหากจดจำในปากจะพบรดقوและกระพุ่งแก้มแดงจัด

ในวันที่ 2-3 ของอาการไข้ หรือ 1-2 วัน ก่อนผื่นจะพบมีตาน้ำเล็ก ๆ ขนาด 1 มม. หรือประมาณเท่าหัวเข็มหมุดอยู่บนกระพุ่งแก้มที่แดงจัด โดยเริ่มขึ้นบริเวณที่ตรงกับฟันกรามซึ่งที่สองก่อน ซึ่งเมื่อเวลาเด็ก ๆ นี้จะหายไปเมื่อผื่นขึ้นแล้วประมาณ 24 ชั่วโมง

ผื่นจะขึ้นประมาณวันที่ 4 หลังจากนี้เริ่มขึ้นร่องวันที่ 4 ผื่นจะมีร่องเป็นร่องที่โน้มไข้ขึ้นสูงที่สุด โดยผื่นจะเริ่มขึ้นที่บริเวณใบหน้าและหลังหูก่อนแล้ว lan ไปลำตัว แขน และขา ลักษณะของผื่นจะเป็นเม็ดเล็ก ๆ คล้าย ๆ ผด แต่ผื่นจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ล้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนไปร์จัลตองมีผื่นเรื้อรังเท้า ซึ่งใช้เวลาประมาณ 48-72 ชั่วโมง หลังจากผื่นเรื้อรังหายากหัด ตาแดง จะหายไปพร้อม ๆ กันไป แต่อาการไข้จะมีต่อไปอีก 1 สัปดาห์ ผื่นจะมีสีคล้ำขึ้น ตูดดูดอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายวันจะค่อยๆหายไป



ถ้าผู้ป่วยเคยมีประวัติเป็นไข้ พrovom กับมีผื่นขึ้น ไม่แน่ใจว่าใช้หัดหรือไม่ ให้check อาการดังนี้

- มีอาการไข้หรือไม่ ล้าไม่โกรไม่ใช่หัด
- วันที่ผื่นขึ้นยังมีไข้หรือไม่ ล้าผื่นเรื้อรัง ใช้ลดลงแล้ว ไม่ใช่หัด
- เมื่อใช้ลดลงแล้ว มีอาการตัวคลายดี ๆ หรือไม่ล้าไม่มีไข้หัด

วิธีการแพทย์ก่อนของหัดที่พบบ่อย

ภาวะแทรกซ้อนของหัดที่พบบ่อยได้แก่

- ปอดอักเสบ
- อุจจาระร่วง
- หูบวมคลื่นอักเสบ
- เยื่อบุตาอักเสบ